



Beschrijving Amerikaanse zwarte eend in de natuur

Leefgebied Amerikaanse zwarte eend in het oosten van Noord Amerika.



■ Jaar rond ■ migratie ■ broedplaats ■ geen broedplaats

Het mannetje heeft uniform zwartbruine lichaamsveren (omzoomd met iets lichter bruin en met interne U-vormige markeringen), contrasterend lichtgrijs hoofd en nek die fijn gestreept is, en donkere kruin, nek en oogstreep. Vleugels zijn donkerbruin van boven met iriserend, blauwpaars tot violet spiegel (glanzende vlek op het bovenoppervlak van de slagpennen) dat nauw omrand is met wit aan de achterrand en zwart aan de voorrand (zwarte punten van de grote dekveren); ondervleugeldeveren wit (vergelijkbaar met die van de wilde eend), met fijne donkere vlekken, en 10 of meer donkerbruine, kleine tot middelgrote dekveren op de vleugel. Wit van de ondervleugel minder helder wit dan bij de wilde eend, maar contrasteert scherper tegen het donkere lichaam en de slagpennen wanneer gezien in de vlucht. Snavel olijfgroen tot geel; poten en voeten roodachtig oranje. Vrouwtje vergelijkbaar met mannetje maar over het algemeen bleker, met interne V-vormige markeringen op de borst (niet U-vormig zoals bij mannetje), snavel olijfgroen tot groenachtig grijs (nooit oranje), met zwartachtige markeringen. Het verenkleed is het hele jaar door vergelijkbaar bij beide geslachten, maar het mannetje in het basiskleed (eclipskleed) (kort gedragen) heeft borstveren zonder interne U-vormige markeringen en andere subtiele verschillen (zie Uiterlijk, hieronder). Onvolwassen exemplaren lijken op volwassenen van hun geslacht, maar ze lijken zwaarder gestreept op de borst en onderkant omdat de veren bredere buffranden hebben maar donkere punten. Voeten meer bruinachtig, niet zo roodachtig als bij volwassenen.



Verskil tussen vrouwtje Amerikaanse zwarte eend en vrouwtje wilde eend.

Vergelijkbare soorten

De Amerikaanse zwarte eend heeft het donkerste verenkleed, de minste hoeveelheid wit op de bovenzvleugel (meestal geen of alleen een smalle rand aan de voorrand van de spiegel) en over het algemeen roodere poten en voeten (volwassenen) dan verschillende vergelijkbare soorten of vormen

waarmee hij verward zou kunnen worden, waaronder de Florida-eend (*Anas fulvigula*), vrouwtjes- en eclipsmannetjes wilde eend, een zuidwestelijke populaties van de wilde eend genaamd Mexicaanse eend (*A. platyrhynchos diazi*). Zwarte eend (beide geslachten) onderscheiden zich van de Florida-eend binnen hun beperkte overlappingsgebied (normaal gesproken alleen in de VS van S. Carolina tot Louisiana) door een donkere, meer zwartbruine kleuring, minder contrasterende bleke randen op de veren van het lichaam. grijzere en gestreepte kop en nek, duidelijke donkere oogstreep, donkere kruin en paarsachtige tot violette tint op de spiegel (versus meer groenachtig blauw); de Florida-eend heeft ook een kenmerkende zwarte vlek aan de basis van de snavel bij de opening, en vrouwtjes hebben een groenachtige tot oranje gele snavel, slechts zelden met zwarte markeringen in het midden. De Amerikaanse zwarte eend heeft 10 of meer bruine veren op de vleugelvoering bij de pols die ontbreken bij de Florida-eend en soortgelijke wilde eenden.

Amerikaanse zwarte eend kruist regelmatig met de wilde eend. Daardoor wordt de populatie zwarte eenden in Noord-Amerika steeds kleiner, en stijgt het aantal kruisingen.