

# Florida-eend of Gevlekte eend



## *Anas fulvigula*

De gevlekte eend, een zuidelijke verwant van de Amerikaanse zwarte eend (*Anas rubripes*) en de wilde eend (*Anas platyrhynchos*)

Seksueel dimorf verenkleed; vrouwtjes hebben bredere buffy bruine verenranden dan mannetjes, wat resulteert in een subtiel maar opvallend lichter uiterlijk. Kop en nek van beide geslachten buffy bruin met wisselende hoeveelheden fijne bruine strepen. Bruine oogstreep. Contourkleed en bovenzvleugeldekveren donkerbruin met buffy bruine randen, wat resulteert in een gevlekt uiterlijk. Tien slagpennen (11 als alula is inbegrepen), speculum iriserend blauwgroen, kan blauwachtig of paars lijken onder sommige lichtomstandigheden, mist voorste witte rand en mist of heeft een zeer dunne, vage, achterste witte rand. Witte ondervleugeldekveren contrasteren scherp met contourkleed tijdens de vlucht. Bovenkaak van mannetjes varieert van olijfgroen tot geel; het helderst tijdens de broedperiode, vrouwtjeskaak varieert van oranje tot olijfgroen met wisselend zwart of bruin zadel of vlekken, het dofst tijdens de broedperiode. Poten feloranje bij mannetjes, doforanje bij vrouwtjes.

Juvenielen zijn duidelijk slanker gebouwd dan volwassenen, vooral mannetjes. Veren op de borst en buik van juvenielen lijken kleiner, minder breed, met een lichtere algehele kleuring dan die van volwassenen. De bovenkaak van juvenielen van beide geslachten heeft een uniforme kleuring die neigt naar licht olijfgroen. Vlekken ontwikkelen zich relatief vroeg aan de onderkant van de onderkaak van vrouwtjes en kunnen worden gebruikt om juveniele vrouwtjes te identificeren.

### Vergelijkbare soorten

Vergelijkbare soorten in Amerika zijn onder meer de Amerikaanse zwarte eend (*Anas rubripes*), de Mexicaanse eend (*A. platyrhynchos diazi*), en de vrouwelijke wilde eend. Niet gemakkelijk te onderscheiden van de Amerikaanse zwarte eend op afstand of in de vlucht, maar de gevlekte eend heeft een iriserende blauwgroene spiegel, terwijl de zwarte eend een paarse spiegel heeft; ook zorgt het buff-eded contourkleed voor een algeheel lichter uiterlijk van de gevlekte eend versus een donker lichaam bij de zwarte eend. De gevlekte eend mist meestal donkere strepen op de buffy bruine kin (de specifieke epitheton *fulvigula* is Latijn voor "bruine keel") die doorgaans wordt aangetroffen bij de Amerikaanse zwarte eend. Gevlekt toont een donkere vlek aan de basis van de snavel die ontbreekt bij de zwarte eend. Afzonderlijke verspreidingsgebieden van de gevlekte eend en de Amerikaanse zwarte eend bieden een redelijk betrouwbare scheiding van de twee soorten, maar de kenmerken van het verenkleed vormen het enige definitieve middel om de twee soorten te onderscheiden. De gevlekte eend mist de voorste witte randen op het spiegeltje en mist meestal of heeft dunne, vage, achterste witte randen, terwijl Mexicaanse eenden en vrouwtjeswilde eenden stevast brede voorste en achterste witte randen hebben rond het iriserende blauwe spiegeltje. De gevlekte eend mist de witte band die wordt aangetroffen op het dorsale oppervlak van de staartpennen van vrouwtjeswilde eenden (d.w.z. wilde eenden hebben een witte staart, terwijl gevlekte eenden een donkere staart hebben).